

**SULLE PRINCIPALI
ULCERI DI
SPETTANZA
CHIRURGICA
DISSERTAZIONE...**

Vincenzo medico Olivieri
(medico), Bartolomeo Panizza



1845. 15

SULLE
PRINCIPALI ULCERI

DI SPETTANZA CHIRURGICA

Dissertazione Inaugurale

DI

VINCENZO ORVIERO

DI VICENZA

ONDE OTTENERE LA LAUREA DOTTORALE IN MEDICINA
DELL' L. R. UNIVERSITA' DI PAVIA, COL CONSENSO
DELL' ILL.^{MO} SODDIS. DIRETTORE, DELLO SPETTABILE
DECANO E DEI CHIA.^{RI} PROFESSORI
DELLA FACOLTA' MEDICA

SOTTO GLI AUSPICJ

DEL DOTT. BARTOLOMEO PANIZZA

PROF. ORD. DI ANATOMIA UMANA

CHIR. DELLA L. R. ORDINE DELLA CORONA FERREA

Nel mese di febbrajo 1844

CON AGGIUNTI LE TESI DA DISPUTARSI



Stampa

NELLA TIPOGRAFIA FUSI E COMP.

1844

1845-1846
1847-1848
1849-1850
1851-1852
1853-1854
1855-1856
1857-1858
1859-1860
1861-1862
1863-1864
1865-1866
1867-1868
1869-1870
1871-1872
1873-1874
1875-1876
1877-1878
1879-1880
1881-1882
1883-1884
1885-1886
1887-1888
1889-1890
1891-1892
1893-1894
1895-1896
1897-1898
1899-1900
1901-1902
1903-1904
1905-1906
1907-1908
1909-1910
1911-1912
1913-1914
1915-1916
1917-1918
1919-1920
1921-1922
1923-1924
1925-1926
1927-1928
1929-1930
1931-1932
1933-1934
1935-1936
1937-1938
1939-1940
1941-1942
1943-1944
1945-1946
1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100

1

2

3

4

5

ALL' ESSENDO DIRETTORE DELLA FACOLTÀ MEDICA

CARLO CAIROLI

PROFESSORE EMERITO E MEMBRO ONORARIO

DELL' I. R. ISTITUTO DI SCIENZE IN MILANO

IN SEGNO DI PROFONDA STIMA E GRATITUDINE.



DELLE ULCERE IN GENERE.

L' **ulcera** è una soluzione di continuità delle parti, con secrezione di umore capace di far venire più o meno la distruzione dei tessuti in cui essa risiede.

Da questa definizione chiaro apparisce la differenza che passa tra ulcera, e piaga. Piaga è la soluzione di continuità delle parti molli, inestetica, con secrezione di pus di buona indole e che gode di tutte le condizioni necessarie ad una perfetta cicatrizzazione. La piaga guarisce da se ogni qualvolta il chirurgo allontani tutto ciò che può alterare una buona suppurazione. L'ulcera allo invece non può guarire se prima non si riduca a stato di piaga mutando cioè il processo ulcerante in processo suppurativo benigno.

Le ulcere possono aver sede nelle parti dure e nelle parti molli. L'umor secreto può essere loquace, viscido, ed umor canceroso. Si dice loquace quando l'umore è tenue, sieroso, sanguinolento, fitto che corrode gli organici tessuti. Siccio quando la materia è tenue, fluida, viscosa, passolente, corrosiva, che generalmente accenna ad un'epoca un po' lontana e fa traversare guasti profondi alle carni ed all'ossatura. L'umor canceroso è viscido, sottile, sanguinolento, lentissimo, e d'indole così perversa da produrre con ispeziale malignità lunghe e profonde corrosioni alle parti circostanti l'ulcera. La causa prossima ed immediata di queste diverse secrezioni consiste in una membrana di nuova formazione che tappezza il fondo dell'ulcera la quale si costituisce in organo secretori.

C A U S E.

Le ulcere esse sono l'effetto di degenerazione di altre malattie locali preesistenti, come sarebbero le ferite suppuranti, gli ascessi, le scottature, le cancrene allo staccarsi dell'escara quando il processo suppurativo devia dall'indole benigna e l'umore si fa di cattiva qualità costituiscono tante specie di ulcere che meri-

tano il nome di semplici; altre volte sono l'effetto di un principio specifico, e queste possono essere locali vale a dire, confinate, come l'ulcera venerea primitiva, ed un sol punto; ovvero costituzionali, che possono presentarsi in qualunque parte, tessuto od organo, come le ulcere sifilitiche secondarie; o finalmente si formano per speciali diatesi quali sono la scrofola, lo scorbuto, l'actritide, o negli individui stati soggetti alla sifide, o per soverchio uso di mercurio.

L'ulcera che riconosce in se stessa la causa della propria esistenza dicesi locale, in caso diverso è sintomo di esistente affezione costituzionale. Tanto nell' uno che nell' altro caso può essere benigna o maligna.

Il professor Thompson rimarca benissimo che l'ulcera locale può farsi costituzionale, il che si osserva frequentemente in pratica nell'ulcera sifilitica primitiva, mentre l'ulcera originata da prova costituzionale del generale può mantenersi ed alimentarsi indipendentemente dalla sua prima origine. Questa cognizione deve rendere accorto il chirurgo di mutare sollecitamente l'ulcera in piaga per ottenerne pronta cicatrizzazione nel primo caso, e nel secondo di non affidare la guarigione dell'ulcera alla semplice cura generale.

Io stesso ebbi più volte occasione di convincermi di questo fatto. In uno fra gli altri casi trattavasi di un certo sig. Giovanni Battista Francesco Capo mastro di professione, che da due anni portava una fungosità nel fondo del canale uditorio con secrezione di loro fetente, originata da sifilide costituzionale, il quale fu curato con unzioni mercuriali, con sublimato corroeivo preso internamente nel decotto d'orzo, e coi decotti di ascleparilla usati per molto tempo, non meno che coll'uso dei purganti; i quali mezzi tutti non valsero menomamente a vincere l'affezione locale. Egli si fu allora solo che il medico curante giudicò insanabile totale infermità, pronosticando di più che col tratto successivo ne sarebbe avvenuta la sordità, che il detto infermo fu affidato alla mia cura quattro mesi dopo la trattata guarigione. Io giudicai sanabile la detta ulcera fungosa coi semplici mezzi, e il mio vaticinio andò vuoto, perocchè nel periodo di un mese coi soli tocchi giornalieri di pietra infernale ed iniezioni d'acqua semplice ottenni una completa e stabile guarigione.

DIAGNOSI.

La diagnosi si deduce da tre fonti 1. dalla storia con cui ebbe origine l'ulcera 2. dalle apparenze particolari presentate dalla medesima 3. dalla costituzione individuale.

Relativamente alla storia con cui ebbe principio l'ulcera conviene informarsi del modo d'origine e forma primitiva della morbosità, in qual modo venne immediatamente curata, quali furono le mutazioni che nel progressivo decorso avvennero, inoltre delle malattie che il soggetto ebbe a soffrire prima della comparsa dell'ulcera.

Nell'ulcera si osservano varie differenze in quanto alla forma, al fondo, ai margini, al grado di sensibilità, e di secrezione. Tutti questi caratteri non sono sufficienti per distinguere le ulcere tra loro. L'istessa specie d'ulcera potèta variate appartenere a seconda del tessuto ed organo affetto, e del diverso stadio della malattia. Non potendo pertanto nello stato attuale delle nostre cognizioni decidere sempre a priori la specie a cui l'ulcera appartiene, dobbiamo giovarci delle istruzioni che si possono avere della storia dell'ulcera, dei caratteri locali della stessa, e degli effetti dei rimedj stati impiegati.

E S I T I

Gli effetti delle ulcere sull'aggravarsi dell'organismo sono sempre relativi alla loro natura ed alla parte affetta. In generale diremo che le ulcere ben di rado possono guarire di per sé; ma fa d'uopo che l'arte rimuova le cause che le mantiene. Rimanendo le ulcere stazionarie possono indurre tristi effetti sul generale dell'economia o per assorbimento dell'umore secreto come avviene nelle ulcere sifilitiche, oppure mediante la consumazione e morte per l'abbondante perdita di materia. Vi sono tuttavia delle ulcere stazionarie che potrebbero dirsi salutari, come sono le metastatiche le quali servono di emuntorio tanto favorevole all'organo nobile principalmente affetto.

PROGNOSE

La prognosi delle ulcere in generale deve essere molto riservata. Abbiamo sovente in pratica occasione di osservare non solo delle ulcere benigne e recenti ma delle fruste o piaghe prodotte da causa traumatica ed in soggetti in apparente menti da qualsiasi lesione nelle quali ad ogni ora una cura pronta

e bene diretta la guarigione non si effettua sì facilmente come si sarebbe giudicato a primo aspetto. Non ha guai in obbi a curare una giovanetta di sette anni avvenente e ben nutrita che riportò una ferita leggero-contusa al sopracciglio, la quale non interessava che la semplice cute per la lunghezza di 4 o 5 linee, e ch'io giudicai guaribile in 15 giorni circa, curata con liste di cerotto diachilon e filaccia, avuto riguardo di tenerla sobria nel vitto. A questa mi fa d'uopo prodigare una cura di due mesi ed associarvi mezzi antisicrofobici interni per ottenere la guarigione.

Sia ben certi quindi nel pronostico a questo sia basato 1. sulla natura dell'ulcera; potrà essere faceto nella benigna, infesto nella maligna. 2. Secondo la sede; in generale tanto più le ulcere sono lontane dal centro della circolazione tanto meno sono facili a guarirsi. Le ulcere cutanee e quelle poste sopra strati muscolari guariscono più facilmente che quelle dei tendini e delle ghiandole. 3. Secondo l'estensione maggiore o minore della soluzione di continuità. 4. Secondo la durata; più l'ulcera è antica, men facile sarà la guarigione. 5. Secondo lo stato dell'ulcera. Quando la superficie dell'ulcera è impura i margini sono incalliti, quando penetrano profondamente, e l'u-

mor securo sia corrosivo e vi sia perdita considerevole di sostanza, infante n'è in generale la prognosi. 6. Secondo l'età. Nei giovani più facilmente guariscono che nei vecchi. 7. Secondo la costituzione. L'ulcera *semphor*, cioè a dire esente da qualsiasi diacresia, fa sperare più facile guarigione.

C U R A.

Nella cura delle ulcere importa acutamente considerare la loro origine e la causa che le mantiene. Dalla ignoranza o trascuratezza di questa importante ed indispensabile cognizione ne viene tutta quella farragine di rimedj e specifici che l'arte ed il volgo seppero inventare.

Intanzi quindi d'imprendere la cura di un'ulcera conviene che si esaurini attentamente se essa sia locale o costituzionale. Nel primo caso si impiegheranno quei rimedj che agiscono unicamente la loro azione nella parte affetta; mentre nell'altro caso fa d'uopo associarvi quei mezzi che valgono a correggere la costituzione, ed a vincere la labe.

Nella guarigione delle ulcere si distinguono tre stadij; il primo di deperimento, il secondo di granulazione, ed il terzo di cicatrizzazione.

Tolte le condizioni che mantenevano l'ulcera, questa si depura e la sua superficie si fa rosso florida, secernente un pus benigno, in una parola si costituisce in una piaga semplice. Nel secondo stadio si formano e si innalzano bottoncini carnosì rosso floridi che formano la granulazione. Nel terzo stadio i bottoncini carnosì di color rosso vivo si coprono di sottile pellicola che si dirige dalla periferia della piaga verso il centro e talvolta dal centro alla periferia, e finisce per cicatrizzarsi.

I mezzi che lavoriscono questi tre stadij sono detti a norma della natura e dello stato delle ulcere. Per le ulcere in quanto alla loro località si possono ridurre ai seguenti:

Acqua pura, od associata agli acidi acetico, solforico e nitrico; gli emollienti; il nitrato d'argento e l'allume ustò, le filacce asciutte, la compressione, l'expectatione, lo spaccare, le aperture, e contro-apertura.

L'acqua adoperata convenientemente spiega i più salutarì effetti come mezzo antilogistico, calmante, emolliente e detergente a norma del varj stati in cui questa si trova.

Il bagno freddo agisce come efficacissimo mezzo ipostenizzante ogni qualvolta esuri in forza l'eccesso di attività del processo infiammatorio. Quando il bagno freddo non è ba-

stantemente protratto non fa che attergiare e disporre la parte ad una più forte reazione; e quindi anzichè soddisfare allo scopo, addi- viene mezzo indiretto di alimento all'infiam- mazione stessa. L'addizione al bagno freddo di una certa quantità di acido acetico, solfo- rico o nitrico, lo rende assai più vantaggioso. L'effetto locale che in questo modo produce si è quello di corrugare vie maggiormente il lume dei vasi capillari, ed impedire quindi che sotto la reazione vitale si accumulino mag- gior copia di sangue nei vasi stessi. In tutte le ulcere accompagnate da infiammazione io quindi raccomando questo efficacissimo mezzo.

Il bagno caldo allo invece applicato ad una parte, promuove la circolazione capillare, da cui dipende delle proprietà vitali, e quindi le condizioni necessarie per determinare la guarigione. Anziocchè poi valga come mezzo co- citante conviene che la temperatura dell'acqua sia da 35 ai 40 gradi del termometro di Reau- mur, ed il bagno sia per qualche tempo pro- tratto, e ripetuto per varj giorni. Nelle ulcere puramente atoniche tornerà utilissimo. Il Pro- fessore Kara nella clinica chirurgia di Vien- na otteneva belle e sollecite guarigioni delle ulcere croniche col semplice mezzo dell'acqua calda.

L'acqua è pure un eccellente detergente, e per riuscire tale la sua temperatura non deve scostarsi da quella della parte su cui si applica, e deve essere adoperata qual semplice mezzo di lavare le impurità che ingombrano e insidiano le soluzioni di continuità. Questo mezzo si userà giornalmente in qualunque stato si presenti l'ulcera.

L'azione degli ammollanti come dimostrò ed evidenzia il chiarissimo mio Professore Giacomini, al quale converrà sempre stima e gratitudine, si limita parimenti alle parti inorguiche. Il sommo beneficio che si ritrae dagli emollienti in una parte infiammata secondo il predetto autore, consiste in primo luogo nel togliere quella secchezza e quel rigore della cuticola che aggiunge non poco di tensione, di stimolo e di nuovo stimolo, per cui l'infiammazione si mantiene e si aggrava. Giorno in secondo luogo gli ammollanti, ed coprire la parte che sia scorsa da logori e difenderla dal tocco di altri agenti meccanici e soprattutto dell'aria. Gli ammollanti in terzo luogo mantengono intorno alla parte infiammata una temperatura pressa a poco costante ed allontanano il repentino passaggio dal caldo al freddo che è tanto proprio ad eccitare ed alimentare la condizione infiammatoria. Finalmente

dagli ammollenti ritrassi un altro beneficio che non è meccanico e sta nelle particelle acquose od oleose che vengono assorbite e diluendo le lise ed il sangue, rendono più placida l'impressione di questi vitali fluidi sui nervi gangliari delle parti vicine.

I principali ammollenti sono l'acqua tiepida, e le materie oleose e pinguedinose. In tutti i casi di ulcere infiammatorie in cui non si voglia adoperare il bagno freddo, si usano gli ammollenti.

Gli escretici, come il nitrato d'argento sotto forma solida o sciolto nell'acqua, l'allume azzurro ecc. sono meno valevoli a distruggere le fungosità e ad eccitare la granulazione. Il loro uso intempestivo riesce dannoso mantenendo uno stimolo nell'ulcera ed una vegetazione maggiore di quella che comporti la dovuta cicatrizzazione. Si limiti l'uso alle sole ulcere fungose e sifilitiche.

L'azione delle filze siccate consiste nell'assorbire l'umore che si secreta dalla superficie ulcerosa, mantenendola continuamente desecata, per cui più prontamente si cicatrizza. Non tutti però i fili posseggono egualmente siffatta facoltà. Essa è grande nei fili dei vecchi crudi di lino, alquanto minore in quelli di canape; assai poca ne mostrano i fili di cotone, e nes-

sana affatto i fili di seta. Ciò viene sanzionato dall'esperienza, e questi si usano con molto vantaggio in tutti i casi di ulcere indolenti non soverchiamente fungose o con margini assai callosi.

La compressione ha per scopo di attivare l'azione dei vasi assorbenti. Questo mezzo fu concesso dallo stesso Wiseman, che raccomandò l'uso delle calze compressive a questo proposito. Il sig. Whately considera la compressione il rimedio principale per le ulcere indolenti. Questa si eseguisce mediante fasce, compresse e lamine metalliche. Sovente meglio soddisfanno a questo intento le liste di cerotto applicate secondo il metodo di Baynton. Non è già che il cerotto d'uchilon abbia un potere solvente od attivante l'assorbimento per se, ma deve si preferire per la sua forza di adesione che mantiene una costante compressione, ciò che non può dirsi in generale della semplice fasciatura. Acciocchè poi si riesca nel suo intento conviene che la compressione sia fatta da mano perita. Si usa la compressione nelle ulcere inerti callose, fungose, edematose, e varicose (1).

(1) A togliere la causa delle ulcere varicose si propone siccome per gli aneurismi la legatura del tronco principale.

Per l'esportazione si adoperano le forbici od il bisturi; questo mezzo è indicato nelle ulcere fungose, carcinomatose, con margini

Sir. E. Roma riferì molti casi di vene varicose delle gambe, alcune delle quali accompagnate con ulcere rifletti ai metodi di cura, che, dopo l'asportazione safena guarivano prontamente, con diminuzione della dilatazione delle varicosità.

Il nostro Direttore allorchè disimpegnava la cattedra di istituzioni chirurgiche con tanto vantaggio della pubblica istruzione dell'umanità, fu anche in questa operazione uno de' più fortunati in Italia. Questi però anzichè regolare il cieco fanatismo di generalizzare l'operazione in ogni specie di ulcere ne limitò l'uso ai soli casi in cui l'individuo fosse di buona costituzione ed esente da qualsiasi febbre, perocchè come mi disse le mille volte questo mio esimio precettore, come mai si potrà sperare guarigione, ora le varicosità non sono limitate alla grande safena, ora si diffondono a tutte le vene dell'arto, o sono prodotte e mantenute da ostruzioni addominali? Questo metodo altre volte riuscì inutile, ed ancor non infrequentemente susseguiva da gonorrea debile, o da febbre tifoide, e morte.

Oggidi si limita alla semplice cura palliativa che consiste nella compressione estesa a tutto il membro gravato dalle varici. Con questo mezzo si ritardano i progressi delle varici, coll'impedire la soverchia dilatazione della medesima, e quindi vengono meno l'edema, le ulcere, e le emorragie.

Allorchè poi le varici e la gonfiore degli arti sono pervenute a tal segno da rendere assai difficoltosa la locomozione, lo sperimentai da alcuni anni un mezzo

calloni ed uccò nelle sifilitiche , allo scopo di convertire più prontamente il feudo ulcerooso in piaga semplice.

che mi riuscì felicissimo a ridonare ai membri affetti da cancherovoli varici quasi il loro pristino stato.

Per lo spazio di un mese circa gl' infermi devono giornalmente immergere le gambe sino al ginocchio per un' ora in un bagno di Schencker con entro una certa quantità di ghiaccio per rendere il bagno freddissimo. Poiché asciugate le gambe , se vi sono piaghe ed ulceri si medicano con liscio di corallo secondo il metodo di Baynton ; indi si applica convenientemente la strimetta o la fasciatura come d' uso.

A consolidare i vantaggi di questo metodo di cura varj casi potrei qui addurre d' individuali da me curati, se non che per la brevità di questo lavoro inaugurare a la tenue differenza di conclusione mortale che esisteva fra i varj infermi, parrai poter soddisfare il lettore la storia dei principali.

Curazione L. Giovanni Questa, d' anni 65 di media statura , assai pingue e robusto nel volto , padre di tre figli , soffre di varici alle gambe nell' ultima sua gestione or sono 25 anni. Da quell' epoca in poi , sabbene la Questa addettasse una fasciatura espulsiva , ciò nulla meno le vene varicose si fecero sempre più prominenti e moltiplicate, da cui scaturiva il volume degli arti , facile le emorragie , e sovente una inferna per piaghe ed ulceri varicosi. Costretta per tal modo la Questa ad una quasi totale inazione , si affidò alla mia cura, perchè le feci di qualche sollievo. Nel gennaio del 34 la vidi per la prima volta , ed ecco quell' era il suo stato. Volume degli arti inferiori il doppio del naturale , le vene tutte si manifestavano

Le aperture, contro-aperture, e spaccature sono operazioni indispensabili nelle ulcere varicose o fistolose, per mutare le medesime di suoi rilievi, venisate di podestà, ed al di sopra del conflitto interno delle due tibiae specialmente dell'arto destro trovi un grosso gonfiato di vene varicose, dura, dolentissimo, e poco sopra il moleolo interno d' anche gli altri ulcere varicose non molto estesi. Da circa un' anno questa donna poteva mal reggersi sulle gambe e quasi la locomozione anche aveva la riserva notevolmente perita. De' anche programmi altri con sopra se non che questa malattia fu soggetta a febbri ricche con metodo antilogistico attimo, e s'io debbo giudicare del volume del fegato e della milza, purmi poter concludere che in questi ricorsi si appiattano la condizione patologica di quelle febbri. Premesse due cariche di sangue verde domate l' necessaria tensione dolorifica delle vene varicose, posta alla cura del bagno freddissimo un' ora al giorno per lo spazio di un mese, applicando dopo il bagno per le ulcere varicose le fette di cartello Maclellan secondo il metodo di Rayson, indi la fasciatura espositiva. In questo periodo gli arti divennero pressochè del volume naturale, gran parte delle vene varicose all'atto scomparvero, le ulcere sanate, in una parola si ebbe tale sorprendente vantaggio che la Questa poté d' allora in poi menare una vita attiva, senza esser più molestata da quei malori che accompagnano gravi varicosità.

Curazione Il. Calabri Giovanni, di Milano, possidente, dell'età d'anni 66. di alta statura e barbone nella persona, podetis mal sempre prospera salute. Solo da circa dieci anni di accorsi di variol alle

esse in piuma; onde si possa in seguito promuovere la cicatrizzazione.

Non però tutte le ulcere si possono sottoporre ad una cura radicale.

Le ulcere iniettate e metastoliche furono quindi oggetto di discrepanti opinioni. Giovanni Hunter, Camper, Underwood, sono d'avviso che si possa provocare senza alcuna riserva la chiusura di qualunque piaga ulcerosa. Ilano, Morgagni, Van-Swieten, Schencker, Odle, Stoll e Monteggia protestano contro i danni che emergono per la guarigione di tali ulcere. Fra le due opposte opinioni sostenute da uomini d'altreonde di tanta celebrità e per l'una

giuste per le quali gli fu d'uopo far uso di apposito sifialetto. Non pertanto le vene varicose si moltiplicarono, gli arti divennero assai voluminosi per la distensione di tutte le vene, per cui alquanto molesta s'era la locomozione. Alle vici si associarono due piaghe in vicinanza al maleole interno dell'arto destro, che costrinsero il Calabri a guardare il letto. Fu per tal bisogno chiamato a prestare la sua assistenza nel febbraio del 42. Avvogliasi immediatamente il male all'immersione degli arti nel bagno neo freddissimo con neve per lo spazio di tre settimane, applicando giornalmente le late di cerotto sulla piaga, indi lo sifialetto; e s'ebbe per risultato una sì stabile guarigione non solo delle piaghe ma delle varici stesse, da poter vantare sino oggidì, d'aver ottenuto una cura radicale.

e per l'altra parte sembrami non andar errati coloro che la retta via cercano nel mezzo. Infatti Bell e Calcoli sono d'avviso che sia lecito tentare in molti casi la guarigione delle ulcere inveterate e metastatiche, togliendo così ai malati un' infermità, coll'avvertenza di aprire un follicolo che supplisca la morbosa secrezione già da lungo tempo esistente, e soprattutto avendo riguardo di promuovere lentamente la cicatrizzazione della ulcera in diaccio.

Quivi importa promettere una triplice distinzione. Se l'ulcera è puramente locale, e l'individuo sia di buona costituzione esente da qualsiasi infermità, si può benissimo procurare la cicatrizzazione senza alcuna riserva, potendo con molta probabilità sperare una stabile guarigione. Infatti perchè nei casi ove si associano favorevoli condizioni si dovrà mantenere un' infermità certa per timore di promuoverne una assai incerta? Noi sappiamo dall'anatomia patologica che la secrezione è puramente effusa del tessuto di nuova formazione che tappezza il fondo dell'ulcera. Lasciamo quindi ai professori dell'arte il credere che alla guarigione dell'ulcera debbano sempre tener dietro sistematiche conseguenze. E quivi avverto di non essere tanto corvivi a credere che nei casi ove alla chiusura dell'ulcera si abbero cefalea, diarrea,

nessa ecc. se ne debba sempre attribuire la causa alla procurata cicatrizzazione, potendo tali fenomeni essere veramente accidentali, non avere cioè alcun rapporto di filiazione colla preesistente ulcera. Questo lo si potrà desumere. 1. Dall'essere prodive il malato a tali incomodi. 2. Dalle malattie dominanti e dalle cause che vi possono aver dato origine. 3. Dal tempo in cui tali fenomeni morbosi appaiono dopo la chiusura dell'ulcera. Assicurarsi che le affezioni in corso sono realmente dovute alla cicatrizzazione dell'ulcera, converrà immediatamente aprire un fusticolo od uovo se il caso lo richiede riaprire l'ulcera.

L'ulcera di vecchia data e complicata da malattia nel generale non solo richiede che si premetta la cura della distesi costituzionale ma se d'uso praticare 15 o 20 giorni prima il fusticolo, di procurare la cicatrizzazione dell'ulcera.

Finalmente quelle ulcere che comparvero durante il decremento o scomparsa di una malattia grave, come sarebbe un' affezione polmonale, un' epatide, un' enterite ecc. e tanto più se l'individuo è avanzato in età si dovrà limitarsi ad una semplice cura palliativa, nè mai tentare la guarigione.

DELL' ULCERA COMPLICATA DA MALATIA NEL GENERALE

Ulceri sistemiche.

Le ulcere sistemiche devono essere distinte in primitive e secondarie. L'ulcera primitiva deve essere considerata come malattia puramente locale.

Non tutti però i siliografi si accordano in questa distinzione e quindi nel metodo curativo. La stessa incertezza in cui furono sempre nel precisare se l'ulcera venerea siasi puramente locale o costituzionale, determinò molti medici ad assoggettare esclusivamente tutti i venerei ad una cura interna ed esterna contemporaneamente.

Questo punto di pratica non deve essere omai più contestabile da che soprattutto per opera dell' esimio Dott. Ricord sappiamo che gli accidenti primitivi di sifilide sono ineccezionali, non mai quelli di sifilide costituzionale. Ogni qualvolta pertanto sia dubbio la diagnosi abbiamo la nostra potere un carattere patogenomorfico certo per decidere la questione, e quindi adottare il conveniente metodo curativo.

Nell'ulcera costituzionale oltre la cura lo-

cate consistente nel distruggere il fondo ulceroso, la d'uso soprattutto ricorrere alle frizioni fatte con linimento mercuriale, con la pomata di Cioffo, od ancor la prescrizione interna di qualche preparato di mercurio, come il calomelano, il sublimato corrosivo, i decotti di salisparilla, i purganti, i bagni semplici o meglio ancora quelli a vapore ecc.

Non è già che il mercurio sia assolutamente essenziale per la guarigione della lue, nè creda si debba inferire come vorrebbero alcuni scrittori antichi e moderni che la guarigione spontanea di ulcere sifilitiche od operate senza mercurio sia una prova sufficiente per ritenere che la malattia non era sifilide; perciocchè le osservazioni del sig. Ferguson, Boer, Hennen, Thomson, Guthrie, Baccot, di Galleher e d'altri molti pratici moderni italiani e stranieri mettono in piena luce questo fatto, che le ulcere sifilitiche cioè guariscono senza mercurio.

Ad onta di tante pratiche osservazioni credo non vi sarà alcun medico giudizioso il quale voglia abbandonare nella generalità dei casi un rimedio i cui buoni effetti nella cura della lue sono così luminosi da poterlo proclamare il principe dei mezzi terapeutici.

Io quindi ne escludo l'uso nei soli casi 1. di

regimi o d'individui assai sensibili ed irritabili, 2. nei malati che ostinatamente rifiutano la cura mercuriale, o che non la possono tollerare, 3. di sifilide complicata collo scarlatto, colla tisi polmonare, con emorragia ecc. In queste circostanze sono indicate le decozioni della radice di schisparilla, di legno guajaco, di mezerion, gli acidi, i preparati di antimonio, di jodio, l'estratto d'aconito napello ecc.

Quanto riesce efficacissimo mezzo il trattamento mercuriale nella cura della lue, altrettanto il vidi costantemente inutile od anzi dannoso nelle ulcere sifilitiche primitive. Il caso che vo a narrare può servire d'esempio.

Tuttavolta di un certo sig. N. . . ingegnere architetto di professione, di temperamento sanguigno, esente da qualsiasi labe, il quale era incosso ripetutamente in affezioni veneree di ulcere e blenorrea, da me curato e guarito nel periodo di pochi giorni con la semplice cura locale. L'ultima infezione accade or sono quattro anni; due giorni dopo aver avuto commercio con donna scapetta, si accorse di una pustoletta infiammata alla corona del glande che gli recava lieto prurito. Senza perdere tempo venne da me per essere curato, ma trovandomi assente da Milano, si affidò alla

cure di un riputato medico e chirurgo. Questi fece subito applicare nell' ulcera della filaccia spalmate con linimento mercuriale, e somministrò internamente delle pillole di calomelano ed estratto d'aconito napello. Si persistette in questo metodo per circa un mese aumentando in seguito la dose, perocchè l' ulcera del glande non solo si era fatta maggiore, ma si associò ben tosto un apparato di sintomi assai più imponente, e tale che in brevissimo spazio di tempo ne seguì la totale caduta dei capelli, un più che considerevole, alla fronte crearsi delle macchie brune, delle papule gonfiate un umore linfatico e delle croste (corona di venere). Aperta la bocca si osservavano tumide le gengive ed un po' la lingua, flegmate le fauci, e queste parti tutte qua e là disseminate da punti bianchi od ulceri; nello scroto ed in alcuni punti dell' addome osservaransi delle macchie e delle croste effettive simili a quelle della fronte, finalmente dolori eutroscopi tormentavano moltissimo il nostro paziente. Pensò il medico curante che standosi la sfilida resa universale conveniva senza indugio passare alle antiche mercuriali. A questo punto, l' inferno, anzichè progredire nella cura mercuriale, volle conularmi. Fatto importante rilievo che il sig. N. . . . fa orate

al primo esordire dei sintomi di sifilide, al metodo di cura intrapreso, ed alla rapidità con cui tennero dietro i fenomeni di suppurazione, fui indotto a dare un opposto giudizio del corrente, protestando anzi contro l'uso del mercurio sotto qualsiasi forma, e sottoponendo allo invece il malato all'uso per alcuni giorni di polveri di magnesia con zolfo, ai bagni generali, ed a guarigione inoltrata ai decotti di ascleparilla. Questo semplicissimo trattamento e la prontezza con cui ne seguirono i più salutari effetti, poichè a capo di 15 giorni il malato non altra traccia di male conservava che la calvizie, vienaggiamente mi confermò che la malattia consisteva in un vero morbo mercuriale. Da quell'epoca in poi il soggetto della presente istoria non soffrì più alcun sintomo della avuta malattia.

Ulceri scrofolose.

Le ulcere scrofolose si curano con quei mezzi che valgono a rimuovere quelle potenze che sono capaci di sviluppare e trattenere la scrofola. Governeranno quindi gli alimenti di facile digestione, l'aria pura e la nettezza del corpo. Molti medicamenti furono prescritti per uso interno, tra i quali farò menzione della

china, del ferro, degli antimosiali, del colomelao, della cicuta, del muriato di barite, del caffè di ghinda ecc.

Ulceri scorbutiche.

Anche nelle ulcere scorbutiche si deve innanzi tutto allontanare quelle cause che alimentano la malattia, quindi si raccomanda l'aria pura, gli alimenti di facile digestione ecc. Internamente tornano utilissimi gli acidi vegetabili, il vino di Milman, i preparati marziali, l'ipocacua ecc. Per colutorio può servire lo spirito di codonaria diluito con acqua, gli acidi minerali, l'infuso di salvia ecc.

Ulcere artritiche.

Nella cura delle ulcere artritiche gli sforzi del chirurgo devono essere diretti alla infiammazione articolare. Potrà quindi prescrivere per uso interno, l'aceto, il gusjaco, il colchico, gli antimosiali, i mercuri, una dieta vegetabile, ed il moderato movimento del corpo. I bagni sulfurei, possono tornare vantaggiosi.

FINE.

THESES DEFENDENDAE.



I.

Lapidem infernalem in ulceribus sordidis
corneae quam maxime proficere.

II.

Oleum crotonis magis scopo revellente
quam purgante opitolari.

III.

Tartarum sibi dosi generosa præscrip-
tum virtutem depressivam exercere.

IV.

Sulphatis chininae specifica constans et
certa, virtus stimulas vel depressiva
autem dubia et in praxi spernenda.

V.

Conditio pathologica febrim intermitentium toto cyclo differt a morbis phlogisticis.

VI.

In gastro-enteritide drastica absolute noxia.